

GASTROTUSS[®]

SYROP PRZECIWREFLUKSOWY

Wskazania: Preparat o działaniu osłonowym, tworzący mechaniczną barierę pomiędzy żołądkiem a przełykiem, stosowany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, związanego z nim zapalenia przełyku i uszkodzenia jego nabłonka oraz w celu łagodzenia objawów i innych skutków refluksu: bólu w śródpiersiu, uczucia obrzęku i przeszkody poniżej gardła, zgagi i odbijania się, kaszlu z refluksowego podrażnienia głośni, zapalenia jamy nosowo-gardłowej, dysfonii.

Wspomaga procesy regeneracji nabłonka.

Przeznaczony do stosowania doustnego.

Skład: Alginian magnezu, symetykon, fruktoza, guma ksantanowa, miód, D-pantenol, ekstrakty zapachowe *Althaea officinalis* i *Papaver Rhoeas*, tlenek cynku, węglan sodu, wodorotlenek sodu, sól sodowa estru metylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego, sól sodowa estru propylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego, aromaty naturalne, erytrozyna (E 127), woda oczyszczona.

Opakowania: Butelka: 200 ml i 500 ml z łyżeczką do dozowania.

Torebki: 25 torebek po 20 ml.

Sposób użycia:

Syrup (butelka): Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 20 ml po posiłkach i przed snem.

Syrup (torebki): Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej jedna torebka (20 ml) po posiłkach i przed snem.

Środki ostrożności: Stwierdzona nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu wymienionych w ulotce. Nie przekraczać zalecanych dawek. Przestrzegać zalecanego sposobu użycia. W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeśli pacjent przyjmuje inne preparaty, Gastrotuss należy zażyć jako ostatni. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła. Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności dotyczy prawidłowo przechowywanego preparatu w nieotwieranym opakowaniu. Preparat może wykazywać konsystencję mniej lub bardziej kleistą, co nie ma wpływu na jego jakość. Substancje pochodzenia naturalnego zawarte w produkcie mogą mieć wpływ na jego cechy organoleptyczne, lecz możliwe różnice w zabarwieniu i/lub smaku produktu nie powodują pogorszenia jego jakości.



Wytwórca:



DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA

D.M.G. Italia s.r.l.
Via Laurentina, km 26,700
00040 Pomezia (RM) – Włochy